

Évaluation des données d'abattage de Natura-Beef entre janvier 2016 et mai 2024

*Simon Unternährer** – Le marché du Natura-Beef n'a cessé de se développer depuis la création du label. Cependant quelle a été l'évolution des indicateurs essentiels de ce marché, comme l'âge d'abattage et le poids mort ? Voici une analyse des données d'abattage de ces huit dernières années.

Jusqu'à présent, les nouveaux arrivants dans le programme Natura-Beef ne pouvaient livrer des animaux que durant le deuxième semestre. Au printemps 2024, cette règle a été temporairement levée pour la première fois depuis son introduction en 2022, et tous les producteurs de Natura-Beef ont pu livrer leurs animaux à partir de la semaine 16. Cette décision a été prise à la suite d'une baisse inattendue de l'offre et d'une bonne demande en viande labellisée Natura-Beef.

Pour mieux comprendre et estimer les quantités livrées sur la base des fluctuations saisonnières du marché et de la production, une analyse du poids mort moyen et de l'âge moyen des Natura-Beef abattus a été effectuée pour chaque mois de la période comprise entre janvier 2016 et mai 2024.

Il a ainsi été possible d'identifier différentes tendances, influencées tant par les producteurs que les acheteurs.

Âge d'abattage


Le graphique présentant l'âge d'abattage (graphique 1) montre bien que ce dernier s'effondre systématiquement en mai. Par rapport à l'âge moyen d'abattage sur l'ensemble de l'année, les animaux sont abattus plus de quatorze jours plus jeunes au mois de mai. Ce phénomène s'explique par la mise en estivage de nombreuses vaches allaitantes : les Natura-Beef sont abattus avant l'inalpe, car le règlement de production


***Simon Unternährer** a 24 ans et suit actuellement une formation d'agro-technicien ES. En mai et juin de cette année, il a effectué un stage de six semaines à la gérance de Vache mère Suisse. Cet agriculteur diplômé a grandi dans une exploitation agricole de St. Niklausen (LU), au bord du lac des Quatre-Cantons. Il connaît bien l'élevage allaitant grâce à son grand-père, qui a fait venir ses premières vaches mères à la ferme en 1972. Une fois qu'il aura obtenu son diplôme d'agro-technicien ES, il devrait rejoindre l'exploitation parentale et exercer en parallèle une autre activité dans le secteur agricole. Vache mère Suisse le remercie encore une fois chaleureusement et lui adresse ses meilleurs vœux pour l'avenir.

ne permet pas de séparer les veaux de leur mère. Comme le montre le graphique du poids mort moyen (graphique 2), au mois de mai, le poids mort par animal est également inférieur à la moyenne des mois précédents.

Ces dernières années, les ventes de Natura-Beef ont toujours été plutôt difficiles après les fêtes, en janvier et février. Depuis 2016, l'offre a en effet fortement augmenté durant ces deux mois, en raison d'un nombre accru de vêlages au printemps. La viande labellisée, comme le Natura-Beef, est de plus en plus demandée par les consommateurs et consommatrices durant cette période. Ce déséquilibre entre l'offre et la demande

Âge d'abattage moyen des
NATURA-BEEF 2016/19/23/24 (Graphique 1)





entraîne des temps d'attente pour les livraisons et les animaux sont abattus plus tard. Ce retard est visible dans l'âge moyen d'abattage des animaux Natura-Beef, qui, durant cette période, est tendanciellement plus élevé.

général plus extensive qui explique ces différences. L'estivage de nombreux Natura-Beef est également un facteur explicatif. Le fourrage de nombreux alpages n'atteint pas la qualité de celui de plaine et les animaux ne sont donc pas aussi lourds à la fin de la saison d'estivage que leurs congénères qui ont passé l'été en plaine.

CONCLUSION SUR L'ÂGE D'ABATTAGE

- La période de la montée à l'alpage est facile à identifier, les animaux étant abattus nettement plus jeunes.
 - Les années où l'offre est excédentaire, l'âge à l'abattage augmente.
- Les Natura-Beef atteignent l'âge le plus élevé durant les mois d'hiver.

CONCLUSION SUR LE POIDS MORT

- Augmentation du poids mort en cas d'offre excédentaire au premier trimestre.
 - Le poids mort moyen diminue avant et durant l'estivage.
 - Toutes les années présentent une évolution similaire des poids morts.

L'année 2023, notamment, a été marquée par un marché fortement saturé au premier semestre, engendrant des délais d'attente plus long que les autres années et des abattages plus tardifs.

Poids mort

L'évolution du poids mort moyen par animal a atteint son pic en 2020, à 228,5 kilos. Elle a notamment été influencée par l'absence du canal de vente SwissPrimBeef pour la restauration. On peut supposer que les remontes destinées à la finition ont eu une influence sur ce poids mort élevé.

Si l'on observe l'évolution sur l'année, on constate qu'après un pic en février / mars, le poids mort moyen est en baisse jusqu'à la fin de l'année. Cette évolution est indépendante de la situation du marché. C'est la différence entre l'affouragement hivernal, un fourrage conservé de haute qualité, et l'alimentation estivale, qui présente une part importante de pâturage et est en

Couverture grasseuse

En ce qui concerne la couverture grasseuse des Natura-Beef, on constate une évolution similaire à celle des poids morts (graphique 3). Il y a toutefois nettement moins de différences entre les années que pour le poids mort et l'âge d'abattage. En raison de l'alimentation hivernale un peu plus « intensive », la classe de tissu gras moyenne des Natura-Beef au printemps est légèrement supérieure à la valeur de 3 visée. À partir des mois d'été chauds et jusqu'à la fin de l'année, la couverture grasseuse moyenne tombe en dessous de la valeur cible de 3. En outre, la diminution de la couverture de grasse pendant les mois d'automne est aussi clairement liée à l'abattage de nombreux animaux moins bien couverts parce qu'ils ont passé l'été à l'alpage.

La couverture de grasse peut être influencée de manière déterminante par l'alimentation au cours des derniers mois avant l'abattage. Une alimentation ciblée des animaux

permet d'améliorer la rentabilité de la production de Natura-Beef. Les animaux trop gras sont plus fréquents à la fin de l'affouragement d'hiver. On peut remédier à cette situation en réduisant la part de maïs d'ensilage ou de concentrés. En revanche, il vaut la peine de compléter l'affouragement des animaux estivés une fois de retour dans l'exploitation de plaine pour améliorer la couverture de graisse.

Le choix du taureau utilisé permet également d'améliorer la couverture grasseuse des animaux. Si les animaux abattus ont tendance à présenter une couverture de graisse insuffisante, il est conseillé de tenir compte de la valeur d'élevage GRA (couverture de graisse) ou de la performance de couverture grasseuse Natura-Beef du taureau HBBV utilisé. Si un grand nombre d'animaux abattus sont taxés dans les classes de tissu gras 4 et 5, il se peut qu'ils soient trop précoces et aient tendance, en raison de leur génétique, à accumuler de la graisse dès leur plus jeune âge.

CONCLUSION SUR LA COUVERTURE GRAISSEUSE

- L'affouragement d'hiver permet d'obtenir une bonne couverture grasseuse.
- L'affouragement d'été et l'estivage présentent un risque d'avoir plus d'animaux mal couverts.
- Le choix du taureau peut avoir une influence décisive sur la couverture grasseuse des animaux de boucherie.

Malgré les bonnes ventes du printemps 2024, il faudrait continuer à viser un transfert des Natura-Beef prêts à l'abattage du premier vers le deuxième semestre, afin de pouvoir couvrir au mieux la demande. Il n'est pas garanti que les ventes seront aussi bonnes au printemps 2025 qu'elles ne l'ont été en ce début d'année. ■

CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES 2016-2024

*Simon Unternährer** – En rapport avec l'article ci-dessus, il est aussi judicieux de jeter un bref coup d'œil sur les conditions météorologiques de la période analysée. En voici un aperçu.

2016 : printemps très humide jusqu'à fin mai, juin encore humide, automne très beau et chaud.

2017 : janvier très froid, gelées presque permanentes, très beau printemps précoce, mais ensuite fortes gelées, été moyen.

2018 : tempête Éléonor en janvier, fortes précipitations en hiver, beau printemps, forte sécheresse en été.

2019 : hiver normal, printemps moyen, vague de chaleur en juin, bon été, automne doux.

2020 : hiver doux, pas de neige, printemps chaud et sec, bon été, bon automne.

2021 : hiver moyen, printemps froid avec beaucoup de pluie, été très humide, inondations, forte grêle, automne sec.

2022 : année de record de chaleur, hiver très chaud, peu de précipitations depuis l'hiver, été sec, automne chaud.

2023 : hiver doux, printemps humide, peu de jours de beau temps, puis été sec et chaud, beaucoup de pluie en août, beaucoup de précipitations en automne.

2024 : hiver avec passablement de neige, printemps plutôt humide.

Classe moyenne de tissus gras des NATURA-BEEF 2016/19/23/24 (Graphique 3)

