

## Les larves de la mouche verte : un danger pour les veaux nouveau-nés

*Ulrich Jost\** – Les températures remontent et nos animaux recherchent déjà souvent les zones ombragées du pâturage. Pour certains, la période des vélages est déjà derrière alors que pour d'autres elle sera bientôt d'actualité. Durant les périodes chaudes, une lourde menace pèse sur les veaux nouveau-nés : les mouches !



La mouche verte

Nous avons nous-mêmes été touchés par des attaques de mouches et avons dû protéger les veaux nouveau-nés. Par le biais de cet article, j'aimerais vous présenter la manière dont nous gérons ce problème. Il s'agit bien sûr de nos expériences personnelles, qui ne sont certainement pas exhaustives.


Chez moi, la sonnette d'alarme se déclenche lorsque j'observe des mouches vertes, ces diptères vert-bleu brillant, à proximité des animaux. Je suis d'avis que c'est cette espèce de mouche

qui est la responsable. La ponte ne s'effectue que durant les premières semaines suivant la naissance du veau. Je n'ai encore jamais observé d'attaque sur les animaux plus âgés. Je pense que le danger persiste tant que des restes de liquide amniotique adhèrent à la peau ou que des fèces collent fortement à l'anus. C'est pourquoi j'étales une bonne quantité de graisse à traire sur la queue et l'anus. Lorsqu'une vache vèle en été, je contrôle une fois par jour si le veau est « garni » d'œufs de mouche.

### Conseil en cas d'infestation

Les mouches déposent leurs œufs de préférence autour de l'anus, sur le dos ou vers le nombril. Les œufs sont d'abord cachés dans le pelage. Lors de fortes infestations, des paquets d'œufs, semblables à des flocons de beurre, sont visibles dans les poils. Si je trouve des œufs, je lave et peigne ceux-ci avec du Bätzi (une eau de vie) pour les enlever. En principe, le cordon ombilical est desséché après une quinzaine de jours. S'il tombe avant, je contrôle attentivement le nombril car il se pourrait que des larves l'aient sectionné en le dévorant. Le fait que le veau piétine beaucoup ou qu'il remue fortement la queue constitue d'autres signaux d'alarme.

Tous les éleveurs savent que les veaux sont déjà très alertes après trois jours. Dans le cas contraire, si le veau est beaucoup couché, inerte ou apathique, c'est que quelque chose ne va pas. Si des



Les œufs sont d'abord cachés dans le pelage. Lors de fortes infestations, des paquets d'œufs semblables à des flocons de beurre sont visibles dans les poils.



Ce veau a été tondu trois jours avant ces prises de vue et était fortement infesté de larves. Il a fallu recourir au vétérinaire pour soigner les plaies.

larves ont pu éclore des œufs, cela pourrait expliquer cet état. Les asticots commencent à se nourrir et peuvent littéralement dévorer l'animal par la peau, le nombril, l'anus ou le vagin. Si un animal est infesté de larves, il faudrait faire appel au vétérinaire

### Le fléau des taons

*Veronika Maurer* – Les taons s'attaquent à tous les organismes à sang chaud, y compris l'être humain. Leurs piqûres sont aussi très douloureuses pour le bétail. Elles provoquent des irritations cutanées et des saignements, qui attirent à leur tour des mouches non piqueuses. De nombreux éleveurs bovins croient que c'est à cause de leur odeur que les animaux rentrés à l'étable sont attaqués. Or les taons s'orientent principalement par la vue : ils se dirigent de loin vers des objets grands et ronds et sont moins guidés par leur odorat. Ils évitent l'obscurité. Les étables devraient donc être assombries durant l'été. La pâture nocturne ou la possibilité d'utiliser durant la journée un abri sombre constituent donc le meilleur moyen de protéger les animaux des taons.

*Extrait de BioActualités 3|2016*

et tondre le veau pour pouvoir évaluer l'ampleur de l'attaque, car les asticots ont probablement déjà provoqué des plaies qui doivent être soignées. Le veau devrait ensuite être placé avec sa mère dans une étable fraîche et ombragée jusqu'à sa guérison. ■