

Parage fonctionnel des onglons

*Lina Mazurek** – Un parage fonctionnel réalisé dans les règles de l'art est un élément essentiel de la prévention des maladies des onglons. Il a des effets positifs sur le bien-être des animaux tout en améliorant la rentabilité de l'exploitation.



ONGLONS SAINS

CHEZ LES VACHES
ALLAITANTES

Le parage des onglons a pour but de prévenir autant que possible les affections douloureuses des onglons et de réduire ainsi au mieux les frais importants d'immobilisation et de traitement. En revanche, le traitement des animaux déjà malades ou boiteux n'est pas l'objectif premier de l'opération.

La méthode suisse

La méthode suisse de parage fonctionnel des onglons s'inspire fortement de la méthode néerlandaise de Toussaint Raven. Elle s'articule en cinq étapes, qui sont

effectuées sur chaque pied (voir à ce sujet l'illustration «Parage fonctionnel des onglons des bovins»). L'objectif du parage est de répartir le plus uniformément possible le poids de la vache sur les onglons. De plus, le creusage permet de soulager la zone de la sole qui est particulièrement touchée par les ulcères et d'augmenter l'autonettoyage de l'espace interdigité.

Les problèmes à éviter

L'une des erreurs les plus fréquentes du parage fonctionnel est la suppression exagérée de corne dans la zone du talon, ce qu'il faudrait absolument éviter. La plupart du temps, l'objectif du parage est plutôt de «redresser» l'onglon, en ce sens que, grâce à une coupe correcte, les onglons sont plus élevés après l'opération qu'avant. Un autre problème fréquent est que la coupe laisse la sole trop mince. Si elle cède sous la pression des doigts, c'est qu'elle est déjà beaucoup trop fine et qu'il faut impérativement coller une cale sous l'onglon voisin (plus d'informations

à ce sujet dans le prochain numéro). De même, lors du rognage des bords à l'étape cinq, il ne faut procéder qu'avec beaucoup de prudence afin de ne pas amincir la muraille et ainsi meuler la précieuse surface porteuse.


Nous recommandons en principe de faire effectuer le parage de routine des onglons par un pareur formé et de le documenter numériquement. Les pareurs d'onglons travaillant pour plusieurs exploitations sont en général bien équipés techniquement et disposent d'une grande expérience. Ils garantissent ainsi un parage optimal pour votre exploitation et vos vaches.

Quand et comment procéder au parage ?

Comme chaque exploitation est différente s'agissant du mode de garde, de la race, de l'alimentation et de nombreux autres facteurs, il est difficile de donner une recommandation uniforme. En principe, il s'avère toutefois que le parage des onglons devrait avoir lieu au moins deux fois par an. Selon les exploitations, trois parages par an peuvent être nécessaires. Comme la nécessité d'un parage ne dépend pas uniquement de facteurs liés à l'exploitation, mais que chaque animal a des besoins légèrement différents, il peut également être judicieux d'effectuer le parage du troupeau deux fois par an et d'emmener les vaches à problèmes, les animaux plus âgés ou les taureaux d'élevage lourds une fois de plus au congrain pour les contrôler entre-deux. Les vaches qui ont déjà souffert d'affections graves des onglons et les vaches âgées ont un risque accru de maladies, telles que les ulcères ou le décollement de la muraille. De telles affections sont souvent accompagnées de boiteries et de douleurs et sont également importantes sur le plan économique, car les vaches boiteuses mangent moins, sont



Faites enregistrer numériquement les résultats pendant le parage des onglons. Cela en vaut la peine. (Photo : màd)



(Source: Imz Zurich)

en moins bonne santé et tardent à être de nouveau portantes. De plus, tout traitement des maladies des onglons implique parfois une charge de travail considérable et des coûts supplémentaires pour les soins et les éventuels médicaments. Ainsi, tant l'exploitation que le bien-être des animaux profitent énormément d'un parage effectué à temps.

Le moment le plus opportun pour le parage fonctionnel des onglons doit être décidé en fonction de chaque exploitation. Classiquement, le parage est souvent effectué une fois en automne et une fois au printemps. Dans l'élevage laitier, le parage est de plus en plus souvent effectué en fonction du stade de lactation.

L'avantage des parages classiques de printemps et d'automne réside dans la possibilité de préparer les onglons des animaux de manière optimale pour leur garde en stabulation en hiver, ainsi que pour leur séjour d'été au pâturage ou à l'alpage. Il convient de renoncer à un parage juste avant une

montée à l'alpage, car l'usure des onglons est nettement plus importante sur l'asphalte et les cailloux que lors d'une détention en stabulation ou au pré, ce qui augmente le risque de pathologies d'origine mécanique. Dans ce cas, il est préférable de programmer une intervention environ six semaines avant la montée à l'alpage. Il en va de même pour le déplacement dans une nouvelle stabulation. Dans tous les cas, avant d'intervenir, le pareur d'onglons doit être informé d'un déplacement, d'une rugosité particulière du sol ou d'une montée à l'alpage, afin qu'il puisse adapter le parage ou même le moment de ce dernier.

Contrôler les génisses avant la première saillie

En principe, il est recommandé de contrôler déjà les onglons des jeunes animaux. Les génisses ont certes plus rarement de graves défauts d'onglons que les vaches adultes, mais elles devraient tout de même être contrôlées et parées de manière pré-

ventive, même s'il ne s'agit que de petites corrections. De plus, elles s'habituent directement au congrain et sont moins craintives en cas d'urgence. Dans tous les cas, la première fois qu'une génisse est contrôlée, elle doit l'être avant son admission à l'élevage, c'est-à-dire avant la première saillie. Ensuite, il est recommandé de faire revenir les génisses au congrain tous les six mois et au plus tard six semaines avant le vêlage, afin de leur donner les meilleures conditions de départ possibles. En revanche, aucun parage ne devrait être effectué immédiatement avant ou après le vêlage. Autour de la mise bas, les vaches sont en principe plus sensibles et le risque de blessure augmente, il faut donc absolument éviter le stress. Cela ne s'applique évidemment pas aux boîtiers aiguës, qui doivent être traitées immédiatement.

Faites enregistrer numériquement les résultats obtenus pendant le parage des onglons. Vous obtiendrez ainsi un aperçu à court et à long terme de la santé des onglons dans votre troupeau. En outre, vous contribuerez au calcul des valeurs d'élevage pour les principales maladies des onglons, que vous pouvez utiliser pour le choix du taureau.

Vous désirez en savoir plus ?

D'autres informations, fiches techniques et vidéos sur la santé des onglons, la prévention et les maladies des onglons sont disponibles sur notre site web onglonsains.ch. Les agriculteurs et agricultrices intéressés peuvent en outre suivre régulièrement des cours de parage des onglons, qui leurs permettent d'apprendre en théorie et en pratique les bases du parage et du traitement des onglons. De plus amples informations à ce sujet sont consultables sur le site web



de l'Association suisse des pareurs d'onglons (ASP), à l'adresse onglons.ch.

* méd. vét. Lina Mazurek travaille au Département de médecine vétérinaire clinique de la Faculté Vetsuisse de l'Université de Berne et fait partie de l'équipe du projet de ressources « Des onglons sains – de bon pied vers l'avenir ».